

## Mathématique

## Série n° 4 — Séries de fonctions

**Ex 3.1** – Étant donné un réel  $\alpha \geq 1$ , on considère la suite de fonctions  $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$  de  $[0, +\infty[$  dans  $\mathbf{R}$  définie par  $f_n(x) = x^\alpha e^{-nx}$ .

Discuter de la convergence normale sur  $[0, +\infty[$  de la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  suivant les valeurs du paramètre  $\alpha$ .

**Ex 3.2** – Pour  $0 < a \leq b$  réels fixés, calculer l'intégrale  $I = \int_a^{b(+\infty)} \left( \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx} \right) dx$  après avoir justifié son existence.

**Ex 3.3** – On considère la série de fonctions de terme général  $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n^x}$ , pour  $n \geq 1$ .

1. Déterminer le domaine de convergence simple de cette série de fonctions.
2. Déterminer sur quel domaine la convergence est normale.

**Ex 3.4** – Étudier la convergence de la série de fonctions  $\sum u_n$  où  $u_n(x) = \frac{x^2 e^{-nx}}{n^\alpha}$ ,  $n \in \mathbf{N}^*$ ,  $\alpha \in \mathbf{R}$ .

**Ex 3.5** – Étudier la série de fonctions définie par  $u_n(x) = n(\sin x)^n \cos x$  sur  $[0, \pi/2]$ .

**Ex 3.6** – Étudier la convergence de la série de fonctions de terme général  $u_n(x) = e^{nx \ln n}$  sur  $] -\infty, a]$ ,  $a < 0$  puis sur  $] -\infty, 0]$ .

**Ex 3.7** – Montrer que la série définie, pour  $n \geq 1$ , par  $u_n(x) = (-1)^n \frac{x^2 + n}{n^2}$  est simplement convergente sur  $\mathbf{R}$  mais n'est absolument convergente pour aucune valeur de  $x$ .

**Ex 3.8** – Soit la série de fonctions de terme général  $u_n(x) = \frac{2x}{n^2 + x^2}$ ,  $n \geq 1$ .

1. Montrer que cette série converge normalement sur  $[-1, 1]$ . On note  $f$  sa somme.
2. Exprimer sous forme d'une série de fonctions  $\int_0^x f(t) dt$  pour  $x \in [-1, 1]$ .
3. Étudier la convergence normale sur  $[-1, 1]$  de la série de fonctions de terme général  $v_n(x) = \ln \left( 1 + \frac{x^2}{n^2} \right)$ .
4. Étudier la convergence normale sur  $[-1, 1]$  de la série de fonctions de terme général  $w_n(x) = \frac{2(n^2 - x^2)}{(n^2 + x^2)^2}$ .
5. En déduire  $f'$  sous forme d'une série de fonctions et que  $f$  est croissante sur  $[-1, 1]$ .

**Ex 3.9** – Soit  $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$  une suite de nombres réels. Montrer que si la série de terme général  $na_n$  est absolument convergente alors la série définie par  $a_n \cos nx$  (resp.  $a_n \sin nx$ ) est normalement convergente et de classe  $C^1$  sur  $\mathbf{R}$ .