

## Théorèmes Limites

**Exercice 1** (Premier as). Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite de v.a. indépendantes et identiquement distribuées suivant la loi uniforme sur  $\{1, \dots, 6\}$ . On note

$$T = \inf\{n \geq 1 : X_n = 1\}.$$

1. Décrire les événements  $\{T = k\}$  et  $\{T > k\}$ .
2. Déterminer la loi de  $T$  ainsi que son espérance.
3. Calculer, pour tout  $r \in \mathbf{Z}$ ,  $\mathbb{P}(T > \mathbb{E}[T] + r)$ .
4. Calculer la moyenne de la variable aléatoire  $\sum_{i=1}^T X_i$ .

**Exercice 2.** Soit  $X$  le nombre aléatoire d'avions arrivant en une heure sur un aéroport. On a estimé  $\mathbb{E}[X] = 16$  et  $\mathbb{V}[X] = 16$ .

1. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev, donner une minoration de  $\mathbb{P}(10 < X < 22)$ .
2. Comparer le résultat avec celui obtenu en supposant que  $X$  a pour loi  $\mathcal{P}(16)$ .

**Exercice 3.** En utilisant l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev, combien de fois doit-on lancer une pièce de monnaie pour que l'on ait une probabilité supérieure à 0,9 que le nombre de « pile » sur le nombre de lancers soit compris entre 0,4 et 0,6 ?

**Exercice 4.** 1. Soit  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suivant la loi de Bernoulli de paramètre  $1/2$ . On note  $S_n = X_1 + \dots + X_n$ . Soit  $r > 0$ .

- (a) Calculer, pour tout réel  $\lambda$ ,  $\mathbb{E}[e^{\lambda X_1}]$  et  $e[e^{\lambda S_n}]$ .
- (b) En remarquant que, pour  $\lambda > 0$ ,  $\{S_n/n \geq 1/2 + r\} = \{e^{\lambda S_n} \geq e^{n\lambda(1/2+r)}\}$ , montrer que

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq \frac{1}{2} + r\right) \leq \left(\operatorname{ch}\left(\frac{\lambda}{2}\right) e^{-\lambda r}\right)^n.$$

- (c) En remarquant que, pour  $\lambda > 0$ ,  $\{S_n/n \leq 1/2 - r\} = \{e^{-\lambda S_n} \geq e^{-n\lambda(1/2-r)}\}$ , montrer que

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \leq \frac{1}{2} - r\right) \leq \left(\operatorname{ch}\left(\frac{\lambda}{2}\right) e^{-\lambda r}\right)^n.$$

- (d) En déduire, en utilisant l'inégalité  $\operatorname{ch} x \leq e^{x^2/2}$ , que

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{2}\right| \geq r\right) \leq 2e^{-2nr^2}.$$

2. En utilisant cette dernière inégalité, combien de fois doit-on lancer une pièce de monnaie pour que l'on ait une probabilité supérieure à 0,9 que le nombre de « pile » sur le nombre de lancers soit compris entre 0,4 et 0,6 ?

**Exercice 5.** Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes de loi gaussienne  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

1. Déterminer la densité de la variable aléatoire  $Z = e^X$ .
2. On définit  $U = X + Y$  et  $V = X - Y$ .
  - (a) Quelle est la loi de  $U$  ?
  - (b) Calculer  $\operatorname{Cov}(U, V)$ .
  - (c) Soient  $(U_i)_{i \geq 1}$  une suite de variables i.i.d de même loi que  $U$ . Calculer la limite suivante :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i^2 e^{-\frac{U_i^2}{4}}$$

**Exercice 6.** 1. Soient  $x \in [0, 1]$ ,  $\xi_n(x)$  une v.a. de loi binomiale  $\mathcal{B}(n, x)$  et  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$  une application continue. On pose,

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \quad \forall x \in [0, 1], \quad B_n(x) = \mathbb{E}\left[f(n^{-1}\xi_n(x))\right].$$

(a) Montrer que  $B_n$  est un polynôme. Ce sont les polynômes de Bernstein.

(b) En utilisant l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev, montrer que,

$$\forall x \in [0, 1], \quad \forall \eta > 0, \quad \mathbb{P}\left(|n^{-1}\xi_n(x) - x| \geq \eta\right) \leq \frac{x(1-x)}{n\eta^2} \leq \frac{1}{4n\eta^2}.$$

(c) En remarquant, que, pour  $x \in [0, 1]$ ,

$$|B_n(x) - f(x)| = \left| \mathbb{E}\left[f(n^{-1}\xi_n(x))\right] - \mathbb{E}[f(x)] \right| \leq \mathbb{E}\left[|f(n^{-1}\xi_n(x)) - f(x)|\right],$$

montrer que  $(B_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$  converge vers  $f$  uniformément sur  $[0, 1]$ . On pourra utiliser la partition suivante :  $|n^{-1}\xi_n(x) - x| < \eta$ ,  $|n^{-1}\xi_n(x) - x| \geq \eta$  et utiliser l'uniforme continuité de  $f$ .

2. Soit  $(U_i)_{i \in \mathbf{N}^*}$  une suite de v.a. indépendantes de même loi uniforme sur  $[0, 1]$ . Pour  $x \in [0, 1]$ , quelle est la loi de  $S_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{U_i \leq x}$  ?

**Exercice 7.** Soit  $(X_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$  une suite de v.a. indépendantes de loi uniforme sur  $[-1/2, 1/2]$ . On pose, pour  $n \in \mathbf{N}^*$ ,  $Y_n = n + X_n$ . Trouver la limite en loi de la suite  $(n^{-2} \sum_{i=1}^n Y_i)_{n \in \mathbf{N}^*}$ .

**Exercice 8.** Soit  $X_n$  une v.a. de loi  $\mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n)$  où  $\mu_n$  converge vers  $\mu$  et  $\sigma_n$  converge vers  $\sigma$ . Quelle est la limite en loi de  $X_n$  ?

**Exercice 9.** Refaire l'exercice 3 en utilisant le théorème limite central.

**Exercice 10.** Un serveur informatique est relié à  $n$  ordinateurs. Chaque ordinateur envoie une requête sur le serveur avec une probabilité  $p \in ]0, 1[$ . Quelle capacité doit avoir le serveur pour que la probabilité qu'il soit saturé soit inférieure à 2,5% ?

**Exercice 11.** Un central téléphonique est construit pour 5000 abonnés. Chaque jour, les abonnés téléphonent à l'heure de pointe avec une probabilité égale à 0,02.

Déterminer la capacité du central téléphonique pour qu'il puisse transmettre des communications indépendantes pendant un an sans être saturé avec une probabilité supérieure ou égale à 0,9.

**Exercice 12.** Un restaurateur peut servir 75 repas, uniquement sur réservation. La pratique montre que 20% des clients ayant réservé ne viennent pas.

Combien le restaurateur doit-il accepter de réservations pour avoir une probabilité supérieure ou égale à 0,9 de pouvoir servir tous les clients qui se présenteront ?

**Exercice 13.** On observe des particules dont la durée de vie  $X$  est une v.a. de loi  $\mathcal{E}(\theta)$ ,  $\theta > 0$ .

1. Calculer la probabilité pour qu'une particule déterminée n'existe plus à l'instant  $t > 0$ .

2. Une enceinte close contient  $n$  particules ; leurs durées de vie sont indépendantes et de même loi  $\mathcal{E}(\theta)$ .  $N_t$  désigne le nombre de particules qui ne sont pas désintégrées à l'instant  $t$ . Quelle est la loi de  $N_t$  ? Calculer la moyenne et la variance de  $N_t$ . Étudier  $\mathbb{V}[N_t]$  en fonction de  $t$ .

3. Démontrer que, si  $n$  est assez grand, pour tout  $\alpha$  de  $]0, 1[$ ,

$$\mathbb{P}(N_t > \alpha n) \simeq \mathbb{P}(\xi > A(\alpha, t)\sqrt{n}),$$

où  $\xi$  suit la loi  $\mathcal{N}(0, 1)$  et  $A$  est une fonction à déterminer.

4. Étudier  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(N_t > \alpha n)$ . Si  $t_0 = \ln(2)/\theta$ , calculer  $A(\alpha, t_0)$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(N_{t_0} > n/2)$ .